



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLIIY TA'LIM, FAN VA  
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



**BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**  
**MAGISTRATURA BO'LIMI**  
**IQTIDORLI TALABALAR, MAGISTRANTLAR,**  
**TAYANCH DOKTORANT VA DOKTORANTLARNING**

**“TAFAKKUR VA TALQIN”**

*MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIIY-AMALIIY ANJUMANIDA*  
*FAOL ISHTIROKI UCHUN*

*Boboqulova Ozoda Vohidjon qizi*

**SERTIFIKAT**

**BILAN TAQDIRLANADI**

REKTOR



O.X. XAMIDOV

*Buxoro 2025-yil 15-may*



FTORLI DIKETON ASILGIDRAZONLAR NIKELLI KOMPLEKS BIRIKMALARI  
TARKIBIDAGI ATOMLARNING BOG' UZUNLIGI, BOG'NING EFFEKTIV  
ZARYADLARI HOMO VA LUMO SATHLARINI HISOBLASH

*Boboqulova Ozoda Vohidjon qizi*


*BuxDU, kimyo ta'lim yo'nalishi 1-bosqich magistranti*

[o.v.boboqulova@buxdu.uz](mailto:o.v.boboqulova@buxdu.uz)


**Annotatsiya:** Ushbu ilmiy ishda aroiltriflorasetilmetanlar asosida olingan asilgidrazonlarning nikelli kompleks birikmasi tarkibi va xossalari kvant-kimyoviy usullar yordamida o'rganildi. Kompleks birikma uchun optimal geometriya aniqlanib, asosiy bog' uzunliklari va atomlar orasidagi effektiv zaryadlar hisoblab chiqildi. Ushbu tadqiqot natijalari nikelli komplekslarning strukturaviy va elektron xossalarini chuqur o'rganishga imkon beradi hamda ularning kelgusida sanoat, farmatsevtika va kataliz sohaslarida qo'llanish imkoniyatlarini baholash uchun ilmiy asos yaratadi.

**Kalit so'zlar:** Nikelli komplekslar, aroiltriflorasetilmetan, asilgidrazonlar, kvant-kimyoviy hisoblash, bog' uzunligi, HOMO, LUMO, barqarorlik. Nikel(II) asetatining ammiakli eritmasi va  $H_2L^1-H_2L^9$  ligandlar spirtli eritmalarining ekvimolyar nisbatdagi ta'sirlashuvidan  $NiL^1-NH_3-NiL^9-NH_3$  tarkibli kompleks birikmalar olingan. Bu birikmalarning element analiz IQ-, PMR spektroskopiyasi natijalari kompleks birikmalarning tuzilishi quyidagicha bo'lishi isbotlangan:

«TAFAKKUR VA TALQIN» MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMYI-AMALYI KONFERENSIYASI TO'PLAMI- 2025



$R^F = CF_3$ ;  $X = H$  ( $NiL^1-NH_3$ );  $CH_3$  ( $NiL^2-NH_3$ );  $OCH_3$  ( $NiL^3-NH_3$ );  $Cl$  ( $NiL^4-NH_3$ );  $Br$  ( $NiL^5-NH_3$ );  $NO_2$  ( $NiL^6-NH_3$ ).  $R^F = C_2F_5$ ;  $X = H$  ( $NiL^7-NH_3$ );  $CH_3$  ( $NiL^8-NH_3$ ).  $R^F = C_3F_7$ ;  $X = Cl$  ( $NiL^9-NH_3$ ).



1-rasm.  $NiL^7-NH_3$  kompleks birikmasi tarkibidagi atomlar o'rtasidagi bog'larning effektiv zaryadlari

Hyperchem dasturi hisoblashlariga ko'ra, kompleks tarkibidagi asosiy atomlar quyidagi zaryadlarga ega bo'ldi:



O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI  
OLY TA'LIM, FAN VA  
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI



**BUXORO DAVLAT UNIVERSITETI**  
**MAGISTRATURA BO'LIMI**  
**IQTIDORLI TALABALAR, MAGISTRANTLAR,**  
**TAYANCH DOKTORANT VA DOKTORANTLARNING**

**“TAFAKKUR VA TALQIN”**

**MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANIDA**  
**FAOL ISHTIROKI UCHUN**

***Boboqulova Ozoda Vohidjon qizi***

**SERTIFIKAT**

**BILAN TAQDIRLANADI**

REKTOR




O.X. XAMIDOV

***Buxoro 2025-yil 15-may***




**Annotatsiya:** Aroiltriflorasetilmetanlar asilgidrazonlarining vanadiyli kompleks birikmasi tarkibidagi atomlarning bog' uzunligi va bog'ning effektiv zaryadlari komplekslar kelgusida katalizator sifatida yoki biologik faol moddalar sifatida foydalanish sohasidagi kimyoviy jarayonlarni o'rganish.

**Kalit so'zlar:** Vanadiyli kompleks birikmalar, bog' uzunligi, bog'ning effektiv zaryadi Vanadilli kompleks birikmalar sintez qilish uchun erkin aroilperforasilmetanlar hosilalari va piridinning spirtidagi eritmasi bilan vanadil(II) sulfat ( $VOSO_4 \cdot 3H_2O$ ) va natriy atsetati tuzining ( $CH_3COONa \cdot 3H_2O$ ) suvli eritmaları 1:1:1:2 nisbatsda o'zaro aralashirildi.  $VOL^1 \cdot Py - VOL^5 \cdot Py$  tarkibli kompleks birikmalar bir sutkadan keyin ajratib olingan. Vanadil(II) kompleks birikmalarining IQ spektrlarida erkin ligandlar – aroilperforasilmetanlar benzoilgidrazonlari uchun xos bo'lgan tebranish chastotalarining yo'qligi kompleks birikmalar hosil bo'lganligidan dalolat bergan. Vanadil(II) koordinasion birikmalari namunalaridan olingan IQ spektrlarining tahlili va ulardagi xarakteristik tebranish chastotalarining nikel (II), rux (II), va mis (II) kompleks birikmalari uchun qayd qilingan ma'lumotlarga mos kelishi ularning quyidagi kvadrat – piramidali koordinatsion qurshovli tuzilishi isbotlangan.



X = H(VOL<sup>6</sup>Py); CH<sub>3</sub>(VOL<sup>7</sup>Py); OCH<sub>3</sub>(VOL<sup>8</sup>Py); Cl(VOL<sup>9</sup>Py); Br(VOL<sup>10</sup>Py); NO<sub>2</sub>(VOL<sup>11</sup>Py).



VOL<sup>7</sup>Py kompleks birikmasi tarkibidagi bog'larning effektiv zaryadlari Hyperchem dasturi hisoblashlariga ko'ra, kompleks tarkibidagi asosiy atomlar quyidagi zaryadlarga ega bo'ldi:

Atom turi	Effektiv zaryad (e)
V	+0.163
O (karbonil)	-0.331
N (gidrazon)	-0.209
F	-0.27

Vanadil atomi yuqori musbat zaryadga ega bo'lib, bu uning koordinatsion markazdagi dominant rolini ko'rsatadi. Elektron zichligi fenol kislorod atomlari va gidrazon azot atomi tomon ko'chganligi kuzatiladi, bu esa ligandlar va metal orasidagi elektron almashinuvni tasdiqlaydi.